

LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE COMMENCE SUR VOTRE TABLE DE NUIT

REGARDEZ LES PICTOGRAMMES PRÉSENTS SUR VOS BOÎTES DE MÉDICAMENTS



Médicaments & conduite

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES



La prise de médicaments n'est pas un geste anodin. Conduire après avoir pris certains médicaments comporte des risques. Pour éviter tout danger, ayez les bons réflexes et demandez conseil à votre pharmacien.



0,5€/L
DANS LE SANG

FLASH

Les conseils qui vont suivre concernent :

- la conduite de tout type de véhicules
(voiture, poids lourd, deux-roues motorisés)
et l'utilisation de certaines machines ;
- les médicaments prescrits par le médecin
ou disponibles sans ordonnance.



0,5g/L
DANS LE SANG

1

**Consultez la notice
avant la prise du médicament**

Lisez attentivement la notice.

Les effets ayant des conséquences sur la conduite peuvent se trouver dans les rubriques :

- conducteurs et utilisateurs de machines ;
- mises en garde et précautions d'emploi ;
- effets indésirables.

Les boîtes des médicaments présentant un **risque pour la conduite** comportent un **pictogramme spécifique**.
Ils sont **classés en trois catégories, selon le niveau de risque du médicament**.



NIVEAU 1

Soyez prudent

Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

La prise du médicament ne remet généralement pas en cause la conduite de véhicules, mais nécessite que vous soyez informé-e avant de prendre le volant et que **vous restiez vigilant-e** quant à une manifestation éventuelle des effets signalés dans la notice.



NIVEAU 2

Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

**La prise du médicament peut remettre
en cause votre capacité à conduire.
Il est nécessaire de demander l'avis de votre
médecin ou de votre pharmacien.**



NIVEAU 3

**Attention, danger :
ne pas conduire**

Pour la reprise de la conduite,
demandez l'avis d'un médecin

**La prise du médicament
rend la conduite dangereuse.**

Avant de recommencer à conduire, demandez l'avis de votre médecin. S'il s'agit d'un médicament sans prescription médicale, demandez l'avis de votre pharmacien.



0,5g/L
DANS LE SANG

3 Précisez à votre médecin
traitant et à votre pharmacien
votre mode de déplacement

Le médecin, ou le pharmacien, peut ainsi rechercher le médicament **qui altère le moins possible vos capacités à conduire.**

De plus, indiquez tous les autres médicaments que vous prenez, afin qu'il puisse tenir compte d'éventuelles interactions.



0,5g/L
DANS LE SANG

4 Ne modifiez pas ou n'arrêtez pas votre traitement sans l'avis d'un professionnel de santé

Afin de limiter les risques pour la conduite,
**respectez les heures et les conditions
de prise de votre médicament.** Ne modifiez
pas les doses ou n'arrêtez pas votre traitement
sans l'avis d'un professionnel de santé.



0,5 g/L
DANS LE SANG

5

Soyez attentif
aux signes d'alerte

Ne prenez pas le volant ou arrêtez de conduire
si vous ressentez de la fatigue
ou des effets secondaires tels que
des engourdissements, des tremblements,
des nausées, des vertiges, etc.



0,5g/L
DANS LE SANG

6 Ne multipliez pas
les risques

En cas de fatigue, les effets indésirables des médicaments sur la conduite sont décuplés. La prise simultanée de médicaments **avec de l'alcool et/ou des drogues**, en particulier le cannabis, multiplie les risques d'accident.



Cespharm+
ÉDUCATION ET PRÉVENTION
POUR LA SANTÉ

ansm
Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLES

