

A COMPLETER PAR L'EQUIPE SOIGNANTE

Prévenir le Médecin coordonnateur Dr.....et l'IDE référent hygiène Mr/Mme

Mesures générales

Respect strict des précautions standard (PS) et renforcement de l'hygiène des mains **date**

Pour les résidents malades dès l'apparition du premiers cas

Signalisation sur la porte de la chambre

De préférence matériel à usage unique (uu) ou dédié au patient dans la chambre

Ou à défaut impérativement désinfecté entre deux résidents

Arrêt ou limitation des activités collectives (repas en salle à manger, activités...)

Pour le personnel symptomatique : Mise à l'écart des soins

Pour les visiteurs

Information par voie d'affichage

Limitation des visites

Présentation des visiteurs au personnel avant d'entrer dans la chambre

Hygiène des mains par friction hydro-alcoolique avec un produit hydro-alcoolique

Au niveau de l'établissement

Limiter les mouvements de personnel

Information / formation du personnel et des intervenants extérieurs

Report des sorties (consultations...) et des admissions

Mesures spécifiques GEA

Personnel, résident, visiteur

Friction hydroalcoolique avec un produit validant la norme NF EN 14476

Personnel

Port d'un tablier plastique à usage unique si contact avec le résident ou son environnement

Port de gants non stériles à usage unique si risque de contact avec des selles (nursing, change, bassin...)

Rappel des précautions standard : Si vomissements, port de masque chirurgical et protection oculaire

Entretien quotidien de la chambre et renforcement de l'entretien des locaux (salle à manger, activités, poste de soins, chariots, poignées, mains courantes...)

- au détergent neutre, rinçage, séchage puis eau de Javel.

- ou avec un détergent-désinfectant (Dd) validant une activité sur Norovirus et Rotavirus selon la méthodologie de la norme NF EN 14476

Dispositifs médicaux à usage unique de préférence. Ou dédiés au résident : traitement habituel

Si à défaut réutilisables entre deux résidents : traitement habituel, séchage, puis eau de Javel ou avec un détergent-désinfectant validant une activité sur Norovirus et Rotavirus selon la méthodologie de la norme NF EN 14476.

Excreta : bassin, urinal, seau de chaise percée... : privilégier l'utilisation de sac protecteur avec gélifiant ou lave-bassin. A défaut : traitement habituel, séchage puis eau de Javel ou avec un détergent- désinfectant validant une activité sur Norovirus et Rotavirus selon la méthodologie de la norme NF EN 14476.

Déchets dont gants, tabliers et sur blouses à uu, protections : élimination dans la filière DASRI de préférence, ou à défaut dans un double emballage

Linge : filière contaminée si possible ou à défaut double emballage sans tri préalable

Vaisselle : lave-vaisselle à 60°C

Mesures spécifiques IRA

Personnel, résident, visiteur : Friction hydroalcoolique avec un produit validant la norme NF EN 14476

Personnel et visiteur : Port d'un masque chirurgical dès l'entrée dans la chambre

Personnel : Rappel des Précautions standard (Port de gants non stériles à uu, tablier plastique à uu et protection oculaire si risque de projections ou aérosolisations de liquides biologiques. Ex : expectorations aspirations bronchiques, kiné respiratoire...)

Résident : port d'un masque chirurgical et friction hydroalcoolique si sortie hors de la chambre

Entretien : Quotidien de la chambre au détergent-désinfectant. Renforcement de l'entretien des locaux

Dispositifs médicaux : traitement habituel. Privilégier les dispositifs dédiés au résident

Linge, vaisselle, déchets : Tri et traitement habituel (masque chirurgical éliminé en DAOM)